

Plan de Prophylaxie

Categorie : Culture de Rente - Cacao

Culture du cacao | Calendrier phytosanitaire annuel | Cameroun

1. Calendrier de Traitements Phytosanitaires

Periode	Maladie / Ravageur cible	Produit recommande	Dose
Janv - Fevr	Pourriture brune (Phytophthora)	Fongicide cuivrique	5 L/ha
Mars - Avril	Mirides (capsides)	Insecticide systemique	2 L/ha
Mai - Juin	Pourriture brune + Mirides	Fongicide + Insecticide	Melange
Juil - Aout	Moniliase + Anthracnose	Fongicide de contact	4 L/ha
Sept - Oct	Mirides (pic d'attaque)	Insecticide systemique	2 L/ha
Nov - Dec	Traitement preventif fin saison	Fongicide cuivrique	5 L/ha

2. Lutte contre la Pourriture Brune

La pourriture brune (*Phytophthora megakarya*) est la principale maladie du cacao au Cameroun :

- Enlever et bruler toutes les cabosses malades (taille sanitaire).
- Traiter toutes les 3 semaines pendant les periodes pluvieuses.
- Eclaircir la canopee pour reduire l'humidite (taille d'eclaircissage).
- Ne jamais laisser les vieilles cabosses sur les arbres.

3. Gestion des Mirides (Capsides)

Niveau d'infestation	Seuil d'intervention	Action
Faible (< 5 mirides/arbre)	Surveillance	Traitement preventif
Moyen (5-10 mirides/arbre)	Intervention recommandee	Traitement curatif
Eleve (> 10 mirides/arbre)	Urgence	Traitement intensif + suivi

4. Entretien de la Cacaoyere

- **Desherbage** : 3 fois par an (janvier, mai, septembre).
- **Taille de formation** : Garder 3-5 branches charpentieres.
- **Fertilisation** : Engrais NPK 10-10-20 (200g/pied/an) apres les pluies.

- **Renovation** : Greffer les vieux arbres improduits (> 30 ans).

5. Conseil d'Expert

L'utilisation de variétés améliorées résistantes (Hybride Camerounais) combinée à un bon programme phytosanitaire peut augmenter les rendements de 800 kg/ha à plus de 1500 kg/ha.

Agri-Conseil 237 | www.agricconseil237.com | Ce document est fourni à titre indicatif. Consultez un technicien local pour un suivi personnalisé.