

Plan de Prophylaxie

Categorie : Elevage - Porcs Locaux

Guide d'elevege de porcs | Cycle : 6-8 mois | Production rentable

1. Programme de Vaccination

Age / Periode	Vaccin / Traitement	Voie	Remarque
3-4 semaines	Peste porcine classique	Injection IM	Obligatoire
6 semaines	Rappel peste porcine	Injection IM	Imperatif
2 mois	Rouget du porc	Injection SC	Zones endemiques
Tous les 6 mois	Rappel annuel	Injection IM	Adultes reproducteurs

2. Programme Antiparasitaire

Traitement	Frequence	Produit
Antiparasitaire interne	Tous les 3 mois	Ivermectine ou Levamisole
Antiparasitaire externe	Tous les 2 mois	Spray acaricide
Traitement de la portee	A 3 semaines de vie	Ivermectine injectable
Truies avant mise bas	2 semaines avant	Antiparasitaire + vitamine E

3. Hygiene et Biosecurite

- Nettoyage quotidien des logettes et evacuation des dejections.
- Desinfection complete du batiment entre chaque bande (vide sanitaire 10-15 jours).
- Quarantaine de 21 jours pour tout nouvel animal introduit dans l'elevege.
- Controle strict des visites exterieures (vetements et bottes de protection).
- Gestion securisee des cadavres (enfouissement ou incineration).

4. Surveillance Sanitaire

Signe a surveiller	Cause probable	Action
Fievre + abattement	Infection bacterienne	Appeler veterinaire
Diarrhee des porcelets	E. coli / Rotavirus	Rehydratation + traitement

Toux persistante	Pneumonie	Antibiotique + isolation
Lesions cutanees	Rouget / Gale	Traitement specifique

5. Conseil d'Expert

Un bon plan alimentaire combinant residus agricoles locaux (son de ble, draches, residus de manioc) et complements proteiques permet de reduire les couts d'alimentation de 40% tout en maintenant une croissance optimale.