

Plan de Prophylaxie

Categorie : Elevage - Poulet de Chair

Guide complet du poulet de chair | Cycle : 45 jours | Effectif de reference : 100 sujets

1. Programme de Vaccination

Jour	Vaccin	Voie d'administration	Remarque
Jour 1	Marek	Injection sous-cutanee	A l'ecloserie
Jour 7	Gumboro (1re dose)	Eau de boisson	Matin a jeun
Jour 14	Gumboro (rappel)	Eau de boisson	Matin a jeun
Jour 21	Newcastle (B1 ou LaSota)	Oculo-nasal ou eau	Eviter le stress
Jour 28	Newcastle (rappel)	Eau de boisson	Si zone a risque

2. Programme Antiparasitaire

- **Jour 1-3** : Anticoccidiens preventifs dans l'eau (Amprolium ou Toltrazuril).
- **Semaine 3** : Traitement antiparasitaire interne si necessaire (Levamisole).
- **Tous les 15 jours** : Desinfection du poulailler avec un produit homologue.

3. Hygiene et Biosecurite

Mesure	Frequence	Produit recommande
Desinfection du batiment	Avant chaque bande	Formol 2% ou eau de javel
Lavage des abreuvoirs	Quotidien	Eau propre + vinaigre blanc
Litiere (copeaux de bois)	Renouvellement si humide	Chaux vive si necessaire
Controle des rongeurs	Hebdomadaire	Pieges / Raticides
Vide sanitaire	Apres chaque bande (15j)	Nettoyage complet

4. Surveillance Sanitaire Quotidienne

Observez chaque matin les signes suivants et agissez rapidement :

- Mortalite anormale ($>0,5\%/jour$ = alerte)
- Symptomes respiratoires : toux, eternuements, ecoulements nasaux
- Diarree (couleur anormale des fientes)

- Baisse de consommation d'eau ou d'aliments
- Retard de croissance ou plumage defectueux

5. Conseil d'Expert

Maintenez une temperature constante pendant les 3 premieres semaines (32-35degC). C'est le facteur le plus important pour reduire la mortalite et optimiser la croissance des poussins.